

KETAMINE 10%, pro inj.

Farmaceutische vorm: Injectie oplossing.

Samenstelling:

Per ml oplossing:

100 mg ketamine (als -hydrochloride).

Eigenschappen:

Ketamine is een snelwerkend algemeen anestheticum. De door ketamine teweeggebrachte wijziging in de staat van bewustzijn, gepaard gaande met een diepe analgesie, wordt dissociatieve anesthesie genoemd.

De anesthesieduur is ca. 10-30 min.; het ontwaken duurt ca. 30-60 min.

Doeldieren: Hond, kat.

Indicaties:

Voor het induceren van een kortdurende anesthesie bij onderzoek van onrustige dieren, röntgendiagnostiek, verband wisselen; In combinatie met atropine en xylazine: chirurgische ingrepen als ovariectomie, castratie, keizersnede, kaakoperatie, tandextractie, oog-, neus-, ooroperatie, reinigen van gebit, openen van absces.

Toedieningswijze/dosering:

Intramusculair:

Hond: 5-15 mg ketamine per kg LG.

Kat : 15 mg ketamine per kg LG.

Voor combinatie bij de hond wordt aanbevolen:

- 8 - 20 mg ketamine per kg LG.
- 1- 2 mg xylazine per kg LG. i.m. of s.c.
- 0.05 - 0.1 mg atropine per kg LG. i.m.

Voor combinatie bij de kat wordt aanbevolen:

- 15 - 20 mg ketamine per kg LG.
- 0.5 mg xylazine per kg LG. s.c.
- 0.1 mg atropine per kg LG. i.m.

Wachtwoordadvies: n.v.t.

Contra-indicaties:

decompensatio cordis; intracraniale operaties of schedeltrauma; lever- en nierafwijkingen; glaucoom.

KETAMINE 10%, pro inj.

Bijwerkingen:

- inductie van katalapsie, diepe analgesie, amnesie, waarbij de reflexen van larynx en pharynx aanwezig blijven;
- tijdelijke bloeddrukverhoging en stijging van de hartfrequentie;
- tijdens de inductiefase treedt een lichte ademdepressie op;
- de recovery kan gepaard gaan met excitatie, tremoren en spierkrampen;
- stoornissen in het ademritme, waarbij fasen van de apnoe worden afgewisseld met snelle inspiraties;
- de ogen blijven geopend (uitdrogen cornea), vaak een lichte nystagmus;
- de spiertonus neemt toe, er dient evenwel rekening gehouden te worden met het optreden van convulsies en spierkrampen;
- verhoogde speekselvloed.

Waarschuwingen:

- niet gelijktijdig met choline-esterase remmers zoals organische fosforverbindingen toedienen
- ooglidreflex blijft intact
- in verband met mogelijke overgevoeligheidsreacties dient bij toepassing direct huidcontact vermeden te worden

Bewaarcondities

Beneden 25°C. Niet in koelkast of vriezer.

Verpakking:

Per 35 flacons à 10 ml.

Reg.nr./ kanalisatiestatus: REG. NL 5811 UDD